Таёжные и лесные клещи

Способ применения	Норма разведения	Норма расхода	Количество обработок	Срок до сбора урожая (дни)
Обрабатывается приусадебная территория (участки почвы, газоны, низкие кустарники высотой до 50 см, периметр участка, наружная сторона территории). Обработку проводить в весенне-летний период активности клещей (сразу после схода снега и до осени), желательно за 3 дня до приезда на данную территорию людей	5 мл/1-2 л воды	1-2 литра рабочего раствора на 100 м^2	Средство сохраняется на траве и в почве 1–1,5 месяца. При необходимости по факту наличия клещей на обработанной территории возможна её повторная обработка, но не ранее, чем через 2 недели после предыдущей	Не обрабатывать землю, занятую под сельскохозяйственные культуры (овощи, ягоды, плодовые), детские площадки, песочницы, пасеки и т.п. Сбор ягод и грибов на обработанной территории разрешается не ранее, чем через 40 дней после обработки!

Другие виды клещей или вид клещей неизвестен

Способ применения	Норма разведения	Норма расхода	Количество обработок	Срок до сбора урожая (дни)
Обрабатывается приусадебная территория (участки почвы, газоны, низкие кустарники высотой до 50 см, периметр участка, наружная сторона территории).	12 мл/1-2 л воды	1-2 литра рабочего раствора на 100 м^2	Средство сохраняется на траве и в почве 1–1,5 месяца. При необходимости по факту наличия клещей на обработанной территории возможна её	Не обрабатывать землю, занятую под сельскохозяйственные культуры (овощи, ягоды, плодовые), детские площадки,

Обработку проводить в весенне-летний период активности клещей (сразу после схода снега и до осени), желательно за 3 дня до приезда на данную территорию людей

повторная обработка, но не ранее, чем через 2 недели после предыдущей

песочницы, пасеки и т.п. Сбор ягод и грибов на обработанной территории разрешается не ранее, чем через 40 дней после обработки!