

Ураган Форте, ВР

Высокотехнологичный системный гербицид сплошного действия.

Состав

500 г/л Глифосат (калийная соль)

Культура

Земли несельскохозяйственного назначения, Пары, Поля предназначенные под посевы

Вредный объект

Двудольные сорняки, Древесно-кустарниковая растительность, Лиственные древесно-кустарниковые породы, Многолетние злаковые, Нежелательная травянистая растительность, Однолетние злаковые

Производитель

Syngenta

Упаковка

20 л

Преимущества препарата

Полностью уничтожает однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, включая их надземные и подземные части, в т.ч. корневища и корнеотпрыски многолетников.

- Эффективный неселективный гербицид широкого спектра действия, уничтожает самые злостные сорняки (осот, пырей, свинорой, вьюнок и др.) и древесно-кустарниковую растительность; обработанные гербицидом УРАГАН ФОРТЕ, ВР сорняки не отрастают вновь;
- Калийная соль (глифосат кислоты) позволяет получить более концентрированную препаративную форму и снизить гектарную норму расхода;
- Обработанные поля меньше подвержены эрозии и имеют большую влагообеспеченность;

Особенности применения

Для максимальной эффективности применяйте препарат, когда сорняки активно вегетируют в благоприятных погодных условиях — при влажной почве и ясной теплой погоде, а также в определенные фазы роста сорняков:

- многолетние злаковые — минимум 4–5 листьев, 10–20 см высотой;
- многолетние широколистные — наиболее восприимчивы в фазу цветения или около фазы цветения, но до начала старения;
- однолетние злаковые и широколистные — когда злаковые имеют минимум 5 см лист, а широколистные — минимум 2 раскрывшихся настоящих листа;

Совместимость

Совместим с гербицидами БАНВЕЛ, ВР, ДИАЛЕН СУПЕР, ВР, ЛОГРАН, ВДГ.

Совместимость с другими гербицидами, применяемыми в те же сроки, необходимо проверять в каждом конкретном случае.

Норма расхода и инструкция по применению

Культура	Норма	Вредный объект	Способ и время обработки
Объекты города (села): трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и др. объекты	1,5-3,5	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Плодовые, виноградники	1,5-3	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га
Плодовые, виноградники	3-4	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га
Пары	1,5-3	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. Допуск людей для сбора ягод и грибов на обработанные площади – через 15 дней
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)	1,5-3 1,5-3 (А)	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)	3-4 3-4 (А)	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)	4 4 (А)	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и другие)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га

Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лён), масличные, цветочные декоративные и другие яровые культуры)	1.5 – 3 1.5 – 3 (А)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лён), масличные, цветочные декоративные и другие яровые культуры)	3-4 3-4 (А)	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га

Применение в личном подсобном хозяйстве

Культура	Норма	Вредный объект	Способ и время обработки
Поля, предназначенные под посев и посадку цветочно-декоративных растений	60 мл/10 л воды	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Осеннее опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних сорняков под посадки следующего года. Расход – 3 л/100 м ²
Поля, предназначенные под посев и посадку цветочно-декоративных растений	90 мл/10 л воды	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Осеннее опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних сорняков под посадки следующего года. Расход – 3 л/100 м ²
Участки, предназначенные под газоны	90 мл/10 л воды	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних сорняков за 20-30 дней до посева газонных трав. Расход – 3 л/100 м ²

Регламенты применения десиканта

Культура	Норма	Вредный объект	Способ и время обработки
Зерновые культуры	1,5-3	Десикация	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Механизм действия гербицида Ураган

Гербицид Ураган действует системно, поэтому уничтоженные ранее сорняки вновь не отрастают. Это достигается за счет того, что обработка препаратом проводится в период активной вегетации, в том числе на ранней стадии цветения до начала зарождения семян. Поэтому повторное заражение старыми сорняками не происходит.

Полное уничтожение сорняков происходит не сразу, а в течение длительного периода. Первичное поражение происходит в течение 5 дней, а окончательное уничтожение наступает лишь через 2-3 недели. Признаки гибели сорняков очевидны. Сначала их листья желтеют, затем темнеют и в конечном итоге отмирают.

Этапы приготовления действующего раствора:

- наполнить баковую емкость наполовину водой;
- влить необходимое количество гербицида;
- добавить жидкость до требуемого объема и перемешать.

При обработке гербицидом необходимо пользоваться специальной защитной маской, препятствующей вдыханию больших доз препарата. При попадании на кожные покровы, его нужно тщательно смыть обильным потоком воды.